



# Notfall-Einweisung

von Praxis: \_\_\_\_\_

Patient\*innendaten / Etiketle:  
(Bei Kindern auch Vorname der Eltern) \_\_\_\_\_

Einweisungsgrund: \_\_\_\_\_

Nebendiagnose: \_\_\_\_\_

### **Medikation:**

(Bitte Zutreffendes ankreuzen, bei "Andere" bitte Dosierung und Intervall hinzufügen)

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Alles nach Schema                        | <input type="checkbox"/> Co-Amoxi 2,2g i.v 3x tgl.   |
| <input type="checkbox"/> Prednisolon 100 mg Tbl. : 1-0-0:         | <input type="checkbox"/> Kefzol 2g i.v 2 x tgl.      |
| <input type="checkbox"/> Praxilene 200 mg Kps. 2-2-2 bis Austritt | <input type="checkbox"/> Tazobactam 4,5g i.v 3x tgl. |
| <input type="checkbox"/> Valium 5 mg Tbl. 0-0-0-1                 | <input type="checkbox"/> Andere: _____               |
| <input type="checkbox"/> Co-Amoxi 1,2g i.v 3x tgl.                | _____  |

### **Infusion:**

- Alles nach Schema
- 500 ml Voluven 6% 2x tgl.
- 1000ml Ringerlactat über \_\_\_\_\_
- 1000ml Nacl0.9% über \_\_\_\_\_
- Andere: \_\_\_\_\_

### **Reservemedikation:**

- Perfalgan 1g i.v 4x tgl.
- Dafalgan 1g Tbl. 1-1-1-1
- Mefenacid 500 mg Tbl. 1-1-1
- Andere: \_\_\_\_\_

### **Ernährung:**

- Pat. muss nüchtern bleiben, bis \_\_\_\_\_
- Pat. darf nichts essen, nur trinken bis \_\_\_\_\_
- Normale Kost ab sofort \_\_\_\_\_

### **Allgemeine Untersuchungen:**

- MRI am \_\_\_\_\_ um \_\_\_\_\_
- Andere: \_\_\_\_\_

Blutkontrolle am: \_\_\_\_\_  Hb  CRP  Quick  
 Andere: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift / Stempel Praxis